

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



# Памятка KFM

## Кормление телят зимой

Холодная погода оказывает нагрузку на организм теленка. Соответственно, зимой потребность в питании для поддержания жизни молодых животных значительно выше, чем в остальное время года. Поэтому правильный корм и правильный менеджмент имеют решающее значение в этот период, чтобы обеспечить благополучное выращивание и развитие телят.

### Какие негативные последствия для телят имеет холодное время года?

Если поступление питательных веществ недостаточно при повышенной потребности в питании, это отрицательно сказывается на ежедневных приростах телят. Кроме того, ослабляется защитная система. Патогенные микроорганизмы распространяются легче, и теленок подвергается повышенному риску заболеть. Чаще всего встречаются диарея и пневмония. Кроме того, может быть нарушено физиологическое развитие теленка.

### Кормите правильно!

Кормление телят должно быть адаптировано к стрессу от холода. Как только температура опускается ниже 5 °С, количество молока должно быть увеличено примерно на 20 %. Если используется заменитель молока, дозировка должна быть увеличена на 20 г/литр воды.



Рис.: примерный план выпойки

## Зимний чек-лист для телят

- ✓ В первые часы жизни обеспечивается достаточное поступление колострума. Теленок получает не менее 4 литров.
- ✓ Необходимо позаботиться о том, чтобы шерсть теленка быстро высохла. В этом может помочь обогреваемый бокс или тепловая лампа.
- ✓ В течение первых 3 недель для защиты от холода используются одеяла или жилеты для телят. Их можно использовать при температуре ниже 5 °С.

## Стирайте одеяла после каждого использования и убедитесь, что теленок полностью высох перед их использованием!

- ✓ Соблюдайте температуру выпойки! Она должна соответствовать температуре тела теленка. В противном случае теленку придется тратить энергию во время переваривания, чтобы довести молоко до температуры тела.

## Вода также должна быть теплой, чтобы избежать ненужной потери энергии.

- ✓ При температуре ниже 5°C количество выпойки следует увеличить на 20%. Также возможно многократное кормление.
- ✓ Соблюдайте рекомендации из памятки KFM **"Дозировка заменителей молока"** !

## Интенсивное кормление телят действительно оказывает хорошее влияние на последующее развитие молочной коровы.

- ✓ Телята должны всегда находиться на чистой и сухой подстилке, чтобы уменьшить передачу бактериальных патогенов. Чистота также обеспечивается в среде обитания телят, чтобы исключить инфекции.
- ✓ Смотрите памятку KFM **„Шкала оценки подстилки для телят“** !

## Соломы должно быть достаточно! Телята могут устроить себе теплое гнездо в глубокой соломенной подстилке, которая защищает их от холода.

- ✓ Холодные сквозняки приводят к потере тепла тела. Для поддержания нормальной температуры тела животным требуется дополнительная энергия, которую потом уже невозможно использовать для роста. Туман и влажный воздух также приводят к потере тепла.
- ✓ Чтобы убедиться, что животные чувствуют себя хорошо, регулярно измеряйте выборочно температуру их тела.