



## Памятка KFM

### Как правильно хранить молозиво

Молозиво незаменимо для защиты молодых телят от инфекций. Для поддержания качества и доступности иммуноглобулинов необходимо соблюдать следующие правила:

➤ **Максимум 1 час без охлаждения**

Хранение молока при температуре ниже температуры окружающей среды приводит к быстрому росту существующих бактерий и, следовательно, к быстрой порче.

➤ **Максимум 1 день в холодильнике**

Молозиво можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 4°C в течение 24 часов без снижения качества.

➤ **Заморозить можно максимум на 1 год**

Остаточное количество высококачественного молозива должно быть заморожено в качестве резерва. Замораживайте только хорошее молозиво с содержанием более 90 г IgG/л и храните при температуре от - 18 до - 20 °C.

Быстрое замораживание в два этапа: Поместите бутылки в ведро с ледяной водой, а затем поставьте их в морозильную камеру.

➤ **Бутылки или пакеты?**

**ПЭТ-бутылки**

Лучше всего подходят бутылки емкостью 1 л. Чем меньше объем, тем быстрее и бережнее можно разморозить молоко для использования.

Важно: до и после использования бутылки необходимо промывать горячей водой с чистящим средством!

**Пакеты для заморозки**

Пакеты для заморозки (0,5-1,0 л) также являются недорогой альтернативой. Плотнo закрытые с помощью зажима или резинки, пакеты можно замораживать в плоском виде для экономии места. Поместите картон между отдельными пакетами, чтобы они не примерзли друг к другу..

**Метод “молозиво в мешочке”**

Соска или фляга может быть прикручена непосредственно к этому мешочку из серебряной фольги. Это исключает необходимость переливания после оттаивания..

**Система ColoQuick**

С наполнительной станцией, пластиковыми мешками объемом 4 литра, пластиковыми корзинами для хранения, автоматическим лотком для размораживания, соской и набором для дренчевания. К сожалению, очень дорого!

➤ **Бережная разморозка**

Лучше всего это получается на водяной бане при максимальной температуре воды 46 °C или в микроволновой печи в течение короткого времени при низкой мощности (15 мин при 250 Вт для 500 мл колострума). Тем не менее, более 40% иммуноглобулинов разрушается.



Foto: Kerbl/AGROAPEX